

Année 1973

N° 118

THESE

pour le

DOCTORAT en MEDECINE

(Diplôme d'Etat)

Contribution à l'Etude des INTOXICATIONS-MERCURIELLES:
Les Intoxications Mercurielles Consécutives à l'Ingestion de
Produits de la Mer Pollués.

par

M. Denis BACHE

Né le 3 Mai 1947 à Gujan-Mestras - 33 -

Présentée et Soutenue Publiquement le

4 OCT. 1973

Président: M. le Professeur LEMAIRE



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41550828_0033



Reproduction du sceau original de la Faculté de Médecine de CAEN fondée en 1438

FACULTE DE MEDECINE

© 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed by Pearson Education, Inc.

MM. EVRARD	Clinique chirurgicale A
FERNANDEZ	Physique médicale
FOUCAULT	Pathologie expérimentale
GUIHARD	Pédiatrie
LACROIX 1	Clinique et pathologie chirurgicales B
LEMAIRE	Physiologie
LEMENAGER	Clinique médicale A
LEVY	Clinique obstétricale
LHIRONDEL	Clinique médicale infantile
MORIN	Sémiologie médicale
OLIVIER	Clinique médicale B
PHELINE	Anatomie
POULAIN	Médecine opératoire
SAVINI	Pharmacologie
VALLA	Médecine générale et thérapeutique
VILLEY	Clinique médicale C

MM. BRION	Psychiatrie
FABRE	Physiologie
IZARD	Histologie et embryologie
MOREL	Bactériologie, virologie
POILPRE	Psychiatrie
THERET	Histologie et embryologie

MM.	BAZIN	Thérapeutique, réanimation médicale
	BEUVE-MERY	Médecine interne
	BEZARD	Chirurgie générale
	DAVERNE	Electro-radiologie
M ^l e	DENIZET	Radiologie
	DESCHAMPS	Dermatologie
	DROSDOWSKY	Biochimie médicale
	GAUBERTI	Médecine préventive et santé publique, Hygiène
	GIGNOUX	Chirurgie générale
	LECHEVALIER	Neurologie
	LEYMARIE	Biochimie médicale
	LOYAU	Rhumatologie
	MANDARD	Anatomie pathologique
	MOULIN	Pharmacologie
	QUESNEL	Anesthésiologie
	ROUSSELOT	Anatomie pathologique
	THOMAS	Immunologie, hématologie
	VENEZIA	Pédiatrie
	ABBATUCCI	Radiologie (Maître de conférences associé).

A ma Femme,

son soutien m'a souvent été précieux.

A mes Parents,

qui m'ont permis de poursuivre des études médicales.

A ma Fille,

A mes Grands-parents,

A mes Beaux-parents,

A tous les miens.

A nos Maîtres de la Faculté et des Hôpitaux
de BORDEAUX et de CAEN.

A Messieurs les Médecins-Chefs de Service
du Centre Hospitalier Louis Pasteur de CHERBOURG.

A Monsieur le Docteur AUBERT
Directeur de Recherches à l' I.N.S.E.R.M.
Directeur du C.E.R.B.O.M.

A Monsieur le Docteur Vétérinaire CUMONT
Maître de Recherches au Laboratoire Central de
Recherches Vétérinaires du Ministère de l'Agriculture.

A Monsieur le Directeur de l'Institut Scientifique
et Technique des Pêches Maritimes,

qui ont bien voulu nous communi-
quer de précieux documents.

Puissent-ils accepter l'expression
de notre reconnaissance.

A notre Président de Thèse,

Monsieur le Professeur LEMAIRE,
Professeur de Physiologie,
Médecin biologiste des hôpitaux,
Officier de la Légion d'honneur,

qui nous a fait le grand honneur
d'accepter la présidence de cette
thèse,

qu'il veuille bien trouver ici
l'expression de notre profond
respect et de notre gratitude.

A Monsieur le Docteur MOREL,
Professeur de Bactériologie, Virologie.

A Monsieur le Docteur GAUBERTI,
Agrégé de Médecine Préventive et Santé Publique, Hygiène,

A Monsieur le Docteur MOULIN,
Agrégé de Pharmacologie,

qui nous ont fait l'honneur de
siéger dans ce Jury.

Hommages respectueux.

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES INTOXICATIONS MERCURIELLES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Les Intoxications mercurielles consécutives à l'ingestion de produits de la mer pollués

2002 7 20

PREAMBULE

— — — — —

Cette thèse est une mise au point sur un problème d'actualité : "la pollution du milieu marin par le mercure et ses dérivés, ses conséquences vis-à-vis de la santé des consommateurs de poissons et de coquillages".

La présence de métaux lourds dans le milieu marin est une acquisition assez récente; les documents ayant trait à cet aspect de la pollution marine sont pour la plupart apparus consécutivement à de graves intoxications alimentaires au Japon; certains concernant notamment les aspects biochimiques de l'intoxication mercurielle, demeurent au stade hypothétique.

Nous avons rassemblé dans ce travail :

- les événements épidémiologiques,
- les sources potentielles de pollution,
- les aspects biochimiques et toxicologiques de l'intoxication mercurielle,
- la symptomatologie d'une intoxication mercurielle d'origine alimentaire,
- les risques de contamination en France,
- les mesures prophylactiques à entreprendre.

Les documents qui ont servi de base à la rédaction de cette thèse proviennent pour la plupart :

- du C.E.R.B.O.M. (Centre d'études et de Recherches de Biologie et d'Océanographie médicale),
- de l' I.S.T.P.M. (Institut Scientifique et Technique des pêches maritimes).

- du Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires du Ministère de l'Agriculture.
- de l' O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé),
- de la F.A.O. (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture),
- de l'O.C.D.E. (Organisation de coopération et de développement économique),

Dans ce travail, le mot mercure, à moins d'indication contraire, est un terme générique, se référant au mercure élémentaire, ses composés, ses ions, tant organiques que non organiques, dans quelque état physique qu'ils se présentent.

~ ~ ~

P L A N

~ ~ ~ ~ ~

- INTRODUCTION.

- EPIDEMIOLOGIE de la POLLUTION MERCURIELLE :

- I) en Irak
- II) au Guatemala, Yougoslavie et Pakistan
- III) aux Etats-Unis
- IV) en Hollande
- V) en Suède
- VI) au Canada
- VII) au Japon.

- LES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION :

- I) Les sources naturelles
 - A- 1^{re} érosion des sols et rochers
 - B- 1^{re} échappement de gaz volcaniques.
- II) Les sources dues à l'activité humaine
 - A- rappel des propriétés physiques du mercure
 - B- les pollueurs
 - 1- les plus importants
 - 2- d'autres de moindre importance.
 - C- les incidences des effluents industriels sur l'environnement.
- III) Le contrôle des sources de pollution.

- LES ASPECTS BIOCHIMIQUES ET TOXICOLOGIQUES :

- I) Les facteurs de toxicité dépendant

- A- de la forme chimique
- B- du temps d'exposition
- C- du mode d'exposition
- D- du régime alimentaire des animaux étudiés
- E- des différences individuelles

II) Mode d'action du mercure d'après l'expérimentation

- A- mercure métal
- B- composés inorganiques
- C- composés organiques
- D- la méthylation biologique du mercure inorganique.

III) Ingestion du méthyl-mercure par l'homme.

IV) Destin du méthyl-mercure dans notre organisme

- A- absorption
- B- répartition
 - 1- dans le système nerveux central
 - 2- dans le foie et les reins
 - 3- dans le sang
 - 4- chez le fœtus.
- C- excrétion.

V) Effets sur les cellules et tissus

- A- répartition intra-cellulaire du mercure organique.
- B- les effets
 - 1- troubles du système nerveux central
 - 2- les lésions génétiques.

- NOBLOGIE DE L'INTOXICATION MERCURIELLE HUMAINE D'ORIGINE ALIMENTAIRE

I) Description d'un cas typique de maladie de Minamata

- A- clinique
 - 1- début
 - 2- après 3 jours
 - 3- après 6 semaines.

- B- aspect évolutif de ces symptômes
- C- les lésions du point de vue anatomo-
pathologique
 - 1- après une latence de 5 ans
 - 2- après une période de 10 ans.

II) Description de la forme congénitale de maladie de Minamata.

III) Possibilités de diagnostic d'un tel empoisonnement

- A- du point de vue clinique
- B- du point de vue biologique
 - a- les méthodes de dosage
 - b- les résultats
 - c- l'intérêt du diagnostic biologique.

IV) Traitement à entreprendre

- A- réduction du méthyl-mercure du sang
- B- atténuation des signes neurologiques.

- RISQUES D'INTOXICATION ALIMENTAIRE AU METHYL-MERCURE EN FRANCE :

I) Teneur en mercure des poissons consommés couramment

- A- les méthodes d'analyse
- B- poissons frais ou congelés
- C- poissons de conserve
- D- conséquences.

II) Teneur en mercure des moules du littoral français

- A- raisons du choix de ce mollusque
- B- échantillonnage
- C- méthodes d'analyse
- D- résultats
- E- les conséquences.

- LA PROPHYLAXIE :

I) Mesures pour diminuer les rejets industriels de mercure

- A- suppression de l'emploi du mercure
 - 1- par des procédés de remplacement
 - 2- en diminuant production et consommation
 - B- augmenter l'efficacité d'emploi du mercure
 - 1- en rendant les procédés plus propres
 - 2- par recyclage
 - C- établissement d'une réglementation.
- II) Etablissement de normes de salubrité des produits de la pêche vis-à-vis des polluants mercuriels
- A- les raisons
 - B- les difficultés d'établissement de ces normes.
- III) Bilan des mesures prophylactiques jusqu'ici publiées
- A- en Suède
 - 1- sur le plan industriel
 - 2- du point de vue hygiène alimentaire
 - B- au Japon
 - C- au Canada et Etats-Unis
 - D- d'après le Comité mixte FAO/OMS d'experts en additifs alimentaires.
 - E- en Italie
 - F- en France.

- CONCLUSION.

- BIBLIOGRAPHIE.

INTRODUCTION

— — — — —

Au cours des siècles, l'homme a appris à modeler le monde selon ses propres désirs; à aucune époque, il ne l'a fait avec autant de succès que depuis l'avènement de la révolution industrielle. Les produits de la technologie humaine ont contribué dans une grande mesure à son bien-être en élargissant le champ de ses activités. Mais ces bienfaits n'ont pas été obtenus sans contre-partie; car les nouveaux procédés technologiques ont provoqué de nouvelles concentrations de corps déjà existants et l'apparition d'une multitude de corps nouveaux, étrangers aux mécanismes biologiques établis. De ce fait, se sont accrus les risques de déséquilibre dans la vie des plantes, des animaux et des hommes.

Depuis quelques années, des préoccupations de plus en plus vives ont été exprimées en raison de la présence de mercure dans certains aliments, notamment les poissons et les mollusques dans l'organisme desquels il s'accumule. De fortes concentrations de ce métal ont été observées dans des poissons capturés dans des baies ou estuaires pollués; il semble que les poissons et les coquillages soient capables de concentrer plusieurs milliers de fois le mercure contenu dans l'eau où ils vivent, constituant ainsi la principale source de contamination des denrées alimentaires par ce métal.

Par ailleurs, le mercure trouvé dans l'organisme des poissons se présente le plus souvent sous forme de méthyl-mercure, c'est-à-dire du plus toxique des composés mercuriels; celui-là même qui fut responsable de 200 cas d'intoxication au Japon (maladie de Minamata) dont plusieurs dizaines ont été mortels et beaucoup d'autres se sont accompagnés de lésions cérébrales irréversibles.

Le mercure et ses dérivés sont reconnus toxiques depuis fort longtemps. En pathologie professionnelle, leur principale voie d'introduction est la voie respiratoire chez l'homme. C'est essentiellement au stade du traitement du minerai et des industries qui l'utilisent dans des ambiances chaudes, qu'apparaissent des accidents d'Hydrargirismes, à la suite de l'inhalation des vapeurs de mercure.

Les sels de mercure peuvent aussi être responsables de troubles graves, consécutifs à leur emploi en thérapeutique ou dans certaines professions à la suite de leur absorption accidentelle par la voie digestive ou respiratoire.

L'introduction des composés organiques du mercure dans l'arsenal phyto-sanitaire a créé une nouvelle source de contamination pour l'homme, résultant de la manipulation de ces produits ou de leur dissémination dans l'environnement.

A la suite d'épidémies d'empoisonnement par le mercure et de la découverte de la contamination des poissons par des composés organiques de mercure, une nouvelle voie d'introduction, la voie alimentaire et une possibilité de dissémination très grande de ce toxique ont été mises en évidence.

Ainsi, la consommation de fruits de mer fortement contaminés pourrait entraîner des accidents d'intoxication si des mesures de prévention et de contrôle sanitaire n'étaient envisagées.

L'objet de cette thèse va donc être d'analyser et de définir les conditions dans lesquelles peuvent apparaître sur le littoral français et dans l'ensemble du pays ces risques de contamination mercurielle.

EPIDEMIOLOGIE DE LA POLLUTION MERCURIELLE

Comme le mercure a été utilisé dès l'antiquité, l'histoire de la toxicité des composés du mercure est longue. Tant que le mercure fut utilisé à des fins médicales, il n'y eut aucun problème. Hippocrate prescrivait régulièrement le cinabre (sulfure rouge naturel de mercure). Quant au roi Mithridate, il en prenait à doses croissantes pour se prémunir contre un éventuel empoisonnement. Au moyen-âge, on l'utilisait couramment comme purgatif. Dès le XVI^e siècle, on le prescrivait dans le traitement de la syphilis. Au XIX^e siècle, on en fit vaste usage, entre autres sous forme de diurétique. Ses inconvénients débutèrent avec son utilisation par l'industrie chimique. En 1700, les habitants de la petite ville italienne de Finale protestaient déjà contre les conséquences mortelles des fumées émises par une fabrique locale de chlorure de mercure.

En 1865, ce fut l'empoisonnement mortel de deux hommes dans un laboratoire de chimie.

1) EN IRAK,

En 1956, une épidémie d'empoisonnement se produisit dans une collectivité, qui eut pour résultat l'hospitalisation d'une centaine de malades avec une douzaine de décès.

Lors d'une autre épidémie dans le même pays en 1960, qui fit plus d'un millier de malades et causa près de trois cents décès, on découvrit que l'intoxication était consécutive à l'alimentation du bétail et de volailles avec des céréales traitées par un fongicide organo-mercuriel.

La plus récente des épidémies et la plus désastreuse qui soit connue, a sévi en Irak en 1972. Elle résulta de la préparation de pain avec du blé traité par un fongicide à l'éthyl-mercure. Le nombre des personnes atteintes a été de plusieurs milliers.

II) AU GUATEMALA, AU PAKISTAN et EN YUGOSLAVIE,

Au cours de la dernière décennie, nous avons noté des épidémies au Guatemala, au Pakistan et en Yougoslavie, qui ont causé plusieurs centaines d'empoisonnements. Dans certains cas, c'était le pain qui avait été fabriqué avec des graines polluées. Dans d'autres cas, la viande servant à la nourriture se trouvait contaminée parce que les animaux avaient été nourris de graines traitées.

III) AUX U.S.A.,

Des cas similaires d'intoxication se sont produits en 1969; plusieurs membres d'une même famille, ayant consommé de la viande de porc nourri avec des graines polluées, ont présenté des troubles cérébraux aigus, allant jusqu'à un état comateux. Un enfant né huit semaines après l'intoxication dans la famille, semblait normal à la naissance; vers 9 mois, l'enfant était hypotonique, retardé et aveugle.

IV) EN HOLLANDE,

En 1969, on a découvert des concentrations élevées en mercure dans les anguilles venant du Rhin.

V) EN SUEDE,

A la même époque, des problèmes de pollution se posent : plusieurs ornithologues observent une diminution inquiétante de certaines espèces d'oiseaux granivores, et les plumes, le foie et les reins des cadavres contiennent une teneur élevée en mercure. Des recherches effectuées parallèlement sur la faune aquatique des lacs et rivières suédoises conduisent à des résultats identiques : teneur élevée en mercure chez les brochets et des insectes aquatiques

capturés en aval d'installations industrielles. Ces études ont montré que l'aspect le plus grave du problème du mercure en Suède était la concentration de ce métal (sous forme de méthyl-mercure) chez les poissons d'eau douce. C'est ainsi que le gouvernement suédois a été amené à interdire la vente de poissons provenant de certains lacs pollués.

VI) AU CANADA,

L'attention ne fut vraiment attirée sur cette pollution qu'en Novembre 1969, lorsque l'on découvrit que du poisson capturé dans les eaux des Grands Lacs contenait jusqu'à 10 ppm de mercure. Au cours des trois mois suivants, près de 450 tonnes de poissons pêchés en zones gravement polluées, furent détruits par incinération. Le gouvernement fut conduit à interdire plusieurs zones à la pêche.

Mais les incidents les plus chargés d'enseignement, tant au point de scientifique qu'épidémiologique, ont été ceux qui se sont produits à Minamata (1953-1960) et à Niigata (1965). Les enquêtes ayant été extrêmement poussées, l'expérience japonaise a permis d'analyser les dangers pour la santé de la collectivité, dus à l'empoisonnement par du mercure organique.

VII) APPARITION DE LA MALADIE DE MINAMATA AU JAPON,

C'est en Mai 1956 qu'une fillette âgée de 6 ans, souffrant d'une maladie inconnue, est la première personne à poser un problème étiologique à un médecin de la ville de Minamata au Japon. A la même époque, on signalait dans un certain quartier de la ville, que des chats, des chiens et des corbeaux mouraient dans d'inexplicables convulsions.

Peu après, huit autres personnes, tous des pêcheurs, présentaient à leur tour des symptômes similaires. Une maladie de l'encéphale d'origine inconnue, se répandant sous la forme d'une épidémie est suspectée. La recherche de ses causes est immédiatement amorcée. Un groupe d'étude médicale de la maladie de Minamata est créé.

Dès Novembre 1956, un rapport publié par le groupe d'études initial, incrimine certains métaux lourds contenus dans les produits de la pêche. Les effluents industriels et les sédiments du fond de la baie de Minamata sont examinés; mais aucune conclusion positive n'en résulte.

En 1959, on continue de signaler de nouveaux malades. Des observations révèlent le taux anormalement élevé de paralysies cérébrales parmi les enfants nés dans la région de la baie de Minamata; on envisage la probabilité d'une forme congénitale de la maladie de Minamata. La pêche dans la baie est interdite. Toutefois, l'origine et la nature du polluant restent à établir.

En 1960, un composé organique du mercure est isolé d'échantillons de coquillages et retrouvé dans les boues déchargées des récipients de réaction d'une fabrique d'acétaldéhyde voisine. La commission d'enquête médicale fait administrer à des chats de l'eau usée provenant de l'usine suspectée. Des troubles convulsifs apparaissent consécutivement à l'injection chez ces animaux. Les études conduisent finalement à la conclusion que l'agent coupable de la maladie de Minamata est un composé alkylmercuriel engendré par le catalyseur au mercure inorganique utilisé dans une fabrique d'acétaldéhyde, rejeté sous forme d'effluent, concentré par la chaîne alimentaire et ingéré par les consommateurs de produits de la pêche autour de la baie de Minamata.

C'est ainsi que l'on a pu expliquer, à la suite de la contamination élevée des produits de la pêche et en raison de l'alimentation essentiellement à base de poissons et de coquillages, que seules les familles de pêcheurs présentaient cet empoisonnement. Quant aux chats et aux chiens qui mangeaient les poissons trouvés morts sur le rivage ou les reliefs des repas, ils présentaient inévitablement la même symptomatologie que leurs maîtres.

Bien que les décharges de Méthyl-mercure eussent cessé dès 1960, les effets cumulatifs du mercure contenu dans les poissons produisirent jusqu'en 1970 quelques nouveaux cas d'intoxication. 121 cas de maladie de Minamata ont été recensés à ce jour, dont 22 à caractère congénital; 54 de ces cas eurent une issue fatale, dont 2 d'origine congénitale.

En 1965, une nouvelle épidémie d'empoisonnement au méthyl-mercure se produit dans la circonscription de Nhgata au Japon. L'étiologie est identique à celle de Minamata : pollution d'une rivière par des effluents riches en dérivés mercuriels issus d'une fabrique d'acétaldéhyde. On a relevé 46 cas de maladie, dont 1 congénitale, avec 6 morts.

Il est rassurant de remarquer que depuis les accidents d'empoisonnement par le mercure survenus au Japon, excepté le cas particulier de l'Irak, et comme suite aux mesures préventives étayées dans divers pays intéressés par des problèmes de pollution mercurielle, aucun nouveau cas d'empoisonnement d'une collectivité n'a été enregistré.

De cette étude épidémiologique, nous déduisons que la source principale de contamination méthylmercurielle de l'homme est son alimentation.

LES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION

On rencontre le mercure, d'habitude en quantités infinitésimales dans tous les systèmes écologiques : dans les sols, dans l'eau, dans l'air et dans les organismes vivants.

Du fait que le mercure peut subir toutes sortes de transformations physiques et chimiques, et du fait qu'il peut être ingéré avec les aliments, il est aisément transporté dans ces milieux et transféré de l'un à l'autre.

Bien qu'une certaine quantité du mercure impliqué dans ces cycles écologiques ait été introduite par des processus naturels, une grande partie a été ajoutée par les activités minières et industrielles de l'homme.

1) SOURCES NATURELLES :

A - Ce sont l'érosion naturelle des sols et rochers avec transport par les rivières jusqu'aux océans.

B - L'échappement de gaz volcaniques vers l'atmosphère puis retour à l'hydrosphère grâce aux précipitations par chute de pluie.

C'est ainsi que dans les zones volcaniques de l'Indonésie, on a constaté que la boue de rivière contenait jusqu'à 30 $\mu\text{g/l}$ de mercure (teneur normale de 0,02 à 0,07 $\mu\text{g/l}$).

Ces sources naturelles expliquent aussi la teneur moyenne de l'eau de mer en mercure qui est de 0,1 ppb; la charge

estimation des océans en mercure serait cent fois supérieure à la quantité de mercure rejetée par l'homme depuis le début de l'industrialisation. En ce qui concerne la toxicité d'un produit chimique (comme les dérivés organiques du mercure) contenue dans l'environnement vis-à-vis de la santé humaine, seul intervient le niveau de concentration et non la quantité totale du produit. C'est pourquoi la plupart des problèmes connus d'intoxication mercurielle, conservent un caractère local résultant de pollutions d'activité humaine ayant entraîné de hautes concentrations locales de produit nocif.

II) SOURCES DUES A L'ACTIVITE HUMAINE :

A - Rappel des propriétés physiques du mercure :

Le mercure, métal connu de l'homme depuis l'antiquité, (en latin : Hydrargyrum ou "argent liquide"), a suscité un intérêt industriel particulier grâce à ses propriétés physico-chimiques.

C'est un métal liquide aux températures ordinaires, présentant une tension de vapeur élevée, une conductivité électrique élevée, une courbe de dilatation régulière. Il donne naissance à des alliages avec de nombreux métaux (amalgames).

B - Les Pollueurs :

1°), parmi les plus importants :

- La production du chlore et de la soude caustique par des procédés électrolytiques (électrolyse d'une solution de chlorure de sodium avec une cathode de mercure métallique).
- La production d'acétaldéhyde à partir de l'acétylène et la transformation de l'acétylène en chlorure et acétate de vinyle utilisant les catalyseurs à base de sels mercuriques.
- La fabrication des pâtes et papiers par l'utilisation de composés organiques du mercure comme fongicides et bactéricides.
- Les industries électriques pour la fabrication des relais, commutateurs, batteries et tubes fluorescents.
- Les industries fabriquant du matériel de contrôle : thermomètres, baromètres, pompes à mercure.

- Les industries de la peinture, principalement pour la production de peintures anticorrosion et antifouling.
- L'agriculture utilisant de grandes quantités de composés organiques et minéraux du mercure comme fongicide et bactéricide.

2°), d'autres de moindre importance :

- Les industries pharmaceutiques utilisant le mercure pour la fabrication des diurétiques, d'antiseptiques, de contraceptifs et de cosmétiques.
- Les industries de purification des métaux utilisant comme réducteur la formation d'amalgame avec le mercure.
- Les cabinets dentaires utilisant le mercure dans des amalgames d'argent et d'étain pour les obturations dentaires.
En Suède, les pertes de mercure dans les cliniques dentaires sont évaluées à 8 tonnes par an.
- Le tannage, lors de la préparation du cuir, utilise les composés du phényl-mercure dans les opérations de secrétage des peaux (agglutination des poils).
- L'utilisation des combustibles fossiles (charbon, pétrole) qui renferment de faibles teneurs en mercure, mais dont la consommation est considérable ; les U.S.A. rejetteraient 1 000 tonnes par an de mercure par combustion de charbon.
- La fabrication des munitions utilisant du fulminate de mercure comme détonateur d'obus et d'explosifs.

C - Les incidences des effluents industriels sur l'environnement :

On connaît mal l'incidence de toutes ces utilisations sur l'environnement. On a estimé que la rupture de thermomètres médicaux dans les hôpitaux canadiens ajoute à elle seule chaque année environ 6 tonnes de mercure à celui qui est déjà répandu dans notre environnement.

Quant aux peintures, elles en étalent chaque année plus de 2 000 tonnes sur les murs sous forme de phényl-mercure; on n'a guère de données sur leur diffusion dans le milieu ambiant.

Quand nous savons que la production mondiale de mercure dépasse les 10 000 tonnes par an, et que près de la moitié de cette production est reversée dans le milieu ambiant, quand on sait que dans certains cas, la mort d'êtres humains a pu être directement attribuée à ces rejets, il est probable que, dans un milieu social où l'emploi du mercure n'est pas réglementé, notre santé est menacée à plus ou moins long terme.

III) LE CONTROLE DES SOURCES DE POLLUTION :

Les recherches faites sur les organismes marins prélevés "in situ" montrent qu'ils sont contaminés par le mercure; mais vue la mobilité du milieu marin, il est souvent difficile de trouver les responsables de la pollution, et l'épidémiologie nous a montré que lorsque le pollueur est identifié, les conséquences en sont déjà graves.

Des contrôles chimiques peuvent être faits sur les effluents, mais même sur des effluents lourdement chargés, les recherches se montrent souvent difficiles et onéreuses. De plus, même en présence de quelques traces de méthyl-mercure dans ces effluents industriels, il est pratiquement impossible d'évaluer le degré de pollution des chaînes alimentaires aquatiques.

C'est pourquoi, le C.E.R.B.O.M. a mis au point un contrôle biologique "in vitro" pour apprécier ces risques de concentration de polluant le long de la chaîne alimentaire. L'étude de la toxicité et des concentrations en méthyl-mercure est effectuée par l'intermédiaire de chaînes trophodynamiques marines.

De cette manière, entre 1969 et 1970, une centaine de rejets industriels ont pu être testés le long des côtes françaises et à l'embouchure des fleuves, jusqu'à la limite de salure des eaux. La chaîne marine utilisée est de type pelagique, comprenant 3 échelons :

- un échelon phytoplanctonique (*Asterionella Japonica*)
- un échelon zooplanctonique (*Artemia salina*)
- un échelon poisson (*Carassius auratus*)

et un consommateur final : un mammifère (la souris blanche).

Ainsi, à partir de cette chaîne, ont pu être recherchées :

- la toxicité directe des effluents sur chaque organisme après un contact de 8 jours.
- la toxicité transmise directement au consommateur final par ingestion de poissons ayant servi à la détermination des seuils toxiques.
- la toxicité transmise par induction : les différents organismes sont introduits successivement dans le milieu avec une concentration de méthyl-mercure permettant la survie de tous les échelons.

La durée d'intoxication fut de 4 jours pour le phytoplancton, zooplancton et les poissons.

Elle fut d'une semaine pour les souris nourries avec un poisson par jour et par souris.

Malgré ces temps d'intoxication très brefs, des accumulations de méthyl-mercure ont été observées au niveau des souris (taux en méthyl-mercure 10 fois supérieur à celui d'une souris non intoxiquée) à partir des industries

- des fibres synthétiques, matières plastiques.
- de la pétro-chimie.
- des papeteries.
- des produits chimiques organiques et minéraux.

Ces faits expérimentaux sont bien démonstratifs,

- de l'origine marine de l'intoxication obtenue au niveau du mammifère.
- du haut facteur de concentration du polluant au niveau de la chaîne alimentaire.

~ ~

[illegible]

I) LES FACTEURS DE TOXICITE :

- soit mercure métal
- soit composés inorganiques du mercure
- soit composés organiques du mercure, parmi ceux-ci le phényl, métoxyethyl, éthyl et méthyl-mercure qui s'est révélé particulièrement toxique.

- soit forme aiguë
- soit forme chronique.

- ingestion
- inhalation.

E = des différences individuelles.

II) MODE D'ACTION DU MERCURE D'APRES LES ETUDES EXPERIMENTALES :

A - Le Mercure métal

est toxique seulement à l'état de vapeurs inhalées; les empoisonnements les plus couramment rencontrés ont été relevés uniquement dans les ateliers d'extraction, de grillage du minerai, de fabrication des thermomètres et instruments de mesure. Ils se caractérisent par une impression de fatigue générale, puis un état dépressif associé à des céphalées, des vertiges, de l'insomnie et une amnésie. Ces signes apparaissent généralement après un temps de latence de un mois.

B - Les composés inorganiques

surtout les sels mercuriques provoquant des lésions de stomatite, gingivite, gastro-entérite et néphrite, allant jusqu'à la mort par urémie.

C - Les composés organiques

le méthyl-mercure, à un degré moindre le phényl-mercure, est le plus disséminé et le plus toxique. Une fois ingéré, il est stable et se fixe en premier lieu sur le système nerveux, conduisant à des lésions et des désordres irréversibles. C'est sur ce composé que portent les principales études expérimentales.

D - La méthylation biologique du mercure inorganique

Si les cas d'intoxication de Minamata et Niigata par les composés organiques du mercure ont pu être directement rattachés à l'émission des mêmes composés dans les effluents industriels, il n'en est pas moins possible que dans la nature, le mercure puisse passer des formes métalliques ou des composés inorganiques aux composés organiques. Des chercheurs ont conduit de nombreuses expérimentations dans ce sens et certains mécanismes sont aujourd'hui assez bien connus. JENSEN et JERNELOV en Suède, ont montré, sans en expliquer le mécanisme, que des micro-organismes non identifiés contenus dans les sédiments de fond d'un lac, pouvaient changer le mercure en méthyl-mercure, dans des con-

ditions aussi bien aérobies qu'anaérobies. Ces résultats indiquent donc l'existence d'une quantité potentiellement inépuisable de méthyl-mercure qui peut être fournie à notre environnement.

Les expériences de WOOD aux Etats-Unis sont plus révélatrices : à l'état normal, on assiste à la formation de méthane à partir de la méthylcobalamine (Vitamine B 12) incubée avec un extrait de *Clostridium Méthanobactérium* et d'ATP sous atmosphère d'hydrogène : en présence d'ion mercurique, un groupe méthyle lié au cobalt de la vitamine B 12 est transféré au mercure sans être réduit en méthane, ce qui aboutit à la formation de méthyl-mercure.

Quant aux chercheurs japonais, ils ont isolé un micro-organisme anaérobie, *clostridium cochlearium*, produisant du méthyl-mercure à partir de l'ion mercurique. Incubé pendant 30 heures à 37°C dans un milieu contenant 10 ppm de chlorure mercurique, 100 ppm de cystéine et 0,05 ppm de vitamine B 12, cet organisme produit 0,12 ppm de méthyl-mercure.

III) INGESTION DU METHYL-MERCURE PAR L'HOMME :

L'extrême dilution du toxique dans les eaux polluées rend impossible l'accumulation du mercure dans les poissons par pénétration directe; et il faut interpréter les fortes concentrations recensées par une accumulation progressive le long de la chaîne alimentaire; cette accumulation est rendue possible par 3 faits :

- le méthyl-mercure est un composé chimiquement stable et son taux d'excrétion est faible : temps de demi-excrétion de l'ordre de 70 jours chez l'homme et 40 jours chez le poisson.
- le méthyl-mercure se combine facilement avec les radicaux sulfhydriques des protéines pour former des liaisons mercaptides.
- le méthyl-mercure accumulé dans l'organisme, n'affecte le système nerveux que chez les animaux supérieurs; il peut donc s'accumuler dans les organes de nombreuses espèces sans nuire à leur existence.

Le méthyl-mercure se fixe particulièrement sur les protéines du milieu marin, donc sur celles du phytoplancton, puis s'accumule dans le zooplancton, les insectes aquatiques, les mollusques et crustacés, et tous les poissons comestibles par l'homme.

Finalement, le facteur de concentration à la suite de ces diverses distributions peut atteindre des valeurs de 1 000 à 10 000.

IV) LE DESTIN DU METHYL-MERCURE DANS NOTRE ORGANISME :

A - Son Absorption :

Elle dépend de sa forme chimique. Pour les composés minéraux, les sels mercuriques, l'absorption d'origine alimentaire est respectivement d'environ 2 % et 50 %. Pour le phénylmercure, elle peut être de 50 à 80 % et, pour le méthylmercure dépasse 90 %. Le métabolisme des composés organiques dépend aussi de leur forme chimique. On constate des différences marquées entre le métabolisme et l'excrétion des composés alcoyl et alkyl mercuriels. La vitesse de conversion des composés organiques en mercure minéral joue un rôle très important dans leur distribution tissulaire et leur excrétion.

B - Sa répartition :

Le méthylmercure ingéré au cours de l'alimentation est pratiquement absorbé en totalité au niveau du tractus digestif. Il se répartit assez uniformément dans tous les organes du corps avec un tropisme marqué pour le système nerveux central, les hématies, les phanères, le foie et les reins. Du méthylmercure contenant l'isotope radioactif ^{203}Hg a été administré à des personnes volontaires et son parcours à travers l'organisme a été suivi pendant 240 jours :

Le ^{203}Hg était présent dans le sang un quart d'heure après ingestion et atteignait une concentration maximale après 6 heures. Une petite fraction (6 %) a été rapidement éliminée après 5 jours. L'élimination de 50 % du mercure ingéré nécessita 70 jours. Aucune trace de mercure n'a été décelée dans le sperme, mais 50 % du mercure a été localisé dans le foie et 10 % dans le cerveau. Au cours d'expériences analogues effectuées avec du mercure inorganique à liaison protéique (Hg^{2+}), on a constaté que le mercure était éliminé en grande partie 4 à 5 jours après son ingestion. Il apparaît donc que la plus grande toxicité du

méthyl-mercure est due surtout à sa longue durée d'élimination, l'autre facteur de gravité étant son pouvoir de traverser la barrière sang-cerveau.

1°) Accumulation dans le système nerveux central :

Les pourcentages y sont généralement moins élevés que dans le foie et les reins, mais ils sont plus élevés que ceux obtenus avec du mercure inorganique. Les cellules cérébrales semblent plus sensibles au toxique que tout autre cellule. Cette accumulation est retardée par rapport à celle qui se produit dans les autres organes. On estime que le cerveau contient 10 % de la charge en toxique du corps.

2°) Hautes teneurs dans le foie et les reins où l'effet de liaison se produit dans une fraction protéique particulière.

3°) Dans le sang, les globules ont une concentration dix fois supérieure à celle du plasma.

4°) Chez le fœtus, le méthyl-mercure traverse la "membrane" du placenta, et de ce fait, la teneur sera plus élevée chez le fœtus que chez la mère (teneur en méthyl-mercure des hématies des nouveaux-nés 20 % plus élevée que celles des mères, ce qui explique la découverte de cas de maladie de Minamata congénitale chez des enfants nés de mères apparemment saines).

La quantité et la structure de la répartition du méthyl-mercure sont affectées par plusieurs facteurs :

- facteurs métaboliques
- habitudes alimentaires
- variations dans le mode d'excrétion
- certains composés sulfhydriles accentueraient la pénétration du toxique dans le cerveau
- rôle antitoxique du sélénium : des études expérimentales ont montré que le sélénium (comme selenite ou selenométhiomine) peut provoquer la diminution du méthyl-mercure chez les rats et les caillies. C'est ainsi qu'une quantité de sélénium dans l'alimentation, comparable à celle que fournit le thon, a réduit la toxicité du méthyl-mercure chez des rats. Il existe

donc une corrélation entre les quantités de méthyl-mercure et de selenium dans l'organisme.

C - Son excrétion :

Elle est très lente et se fait en faible quantité, comme l'ont démontrée les expériences faites avec l'isotope 203 du mercure. L'excrétion de la moitié de la quantité de toxique ingéré demande quarante jours chez le poisson et soixante dix jours chez l'homme.

Elle s'effectue par :

- les matières fécales
- les urines
- les cheveux (le méthyl-mercure se fixant solidement à la kératine)
- la salive, la bile et la sueur.

Chez l'homme, l'incorporation de méthyl-mercure aux cheveux permet d'apprécier la contamination et la rétention de substance toxique, au même titre que dans le sang.

Certains médicaments comme la pénicilline et le B.A.L. (British antilewisite) accélèrent cette excrétion.

V) EFFETS SUR LES CELLULES ET LES TISSUS :

A - Répartition intra-cellulaire du mercure organique :

Des expériences ont été réalisées sur le foie de rat pour déterminer quelles fonctions organiques sont les plus affectées par la présence de ce toxique.

Peu de temps après son administration au rat, le mercure organique est décelé au niveau hépatique, dans la fraction soluble et un peu moins dans le réticulum endoplasmique des cellules. Des concentrations plus faibles apparaissent dans les mitochondries et les lysosomes ainsi que dans le noyau (travaux d'Arrhenius). Avec le temps, la teneur du réticulum endoplasmique baisse pour devenir inférieure à celle des mitochondries et des lysosomes. Donc, du point de vue fonctionnel, le mercure envahit toute la partie extra-nucléaire de la cellule. Cette structure de la répartition subcellulaire s'est montrée fortement

affectée par les variations du régime alimentaire de l'animal; ainsi, des carences du régime en protéines, en vitamine E, en acides aminés sulfhydriles changent cette répartition. Le fractionnement chimique des constituants cellulaires a montré que le méthyl-mercure est associé presque en totalité à la portion protéique (enzymes), à un degré moindre aux acides nucléiques (ARN, ADN) et aux lipides (car le méthyl-mercure est liposoluble, ce qui explique son tropisme cérébral).

Les composés organiques du mercure sont des groupes électrophiles (à faible densité d'électrons) et tendent à se lier fortement avec les groupes nucléophiles (groupe d'atomes et d'ions à forte densité d'électrons) essentiels à la fonction enzymatique. Au niveau des membranes cellulaires, leur affinité pour les groupements sulfhydriles va entraîner des troubles dans les courants ioniques.

B - Les effets :

Du point de vue chimique, les composés organiques du mercure sont des inhibiteurs de l'activité enzymatique des enzymes sulfhydriles intervenant dans la plupart des activités métaboliques intra-cellulaires : fourniture d'énergie, division cellulaire, synthèse protéique.

C'est pourquoi la présence de méthyl-mercure intracellulaire va interférer avec chacune d'entre elles.

C'est grâce aux données sur les effets du traitement pré-natal et post-natal d'animaux sains, par les composés organiques du mercure que l'on a pu constater qu'il existait deux groupes d'effets non mortels dominants.

I°) Les troubles du système nerveux central :

dans le tissu cérébral des rats qui ont reçu de fortes doses de méthyl-mercure, on a observé des troubles de la synthèse des protéines à l'intérieur des cellules. Comme la synthèse protéique constitue un rouage essentiel du mécanisme de régulation de la fonction cellulaire, on peut suggérer que c'est un des mécanismes essentiels des dommages causés au cerveau. Les troubles aboutissent à des déficiences des fonctions motrices et de la vue. Des changements de structure du cortex céré-

bral, le cervelet et les nerfs périphériques ont été expérimentalement observés. On a même noté des changements de comportement chez des rats et des poissons : les expériences permettant de déterminer la capacité pour des poissons provenant de zones contaminées, de garder une position normale dans des courants d'eau en rotation sont significatives à cet égard. On place un poisson dans un tube étroit, animé d'un mouvement de rotation, par lequel passe un courant d'eau. Si, en partant de zéro, on augmente la vitesse de rotation, on atteint une vitesse à laquelle le poisson ne peut plus neutraliser l'effet de torsion qui s'exerce sur son corps : c'est le "niveau critique des tours minute" qui s'abaisse franchement en présence d'un poisson exposé au méthylmercure.

Mais la particularité au niveau du cerveau réside dans le fait que les cellules endommagées, contrairement aux autres cellules de l'organisme, ne sont pas remplacées. Pour compenser cette perte en cellules cérébrales fonctionnelles, leur fonction est reprise par d'autres cellules nerveuses, mais seulement jusqu'à un certain point. Les dommages cérébraux ont donc un effet cumulatif. Au début de l'intoxication mercurielle, on peut ne pas observer de symptômes nerveux; ce ne sera que sous l'influence d'autres facteurs affectant les fonctions cérébrales, durant la vie, que cette diminution des capacités cérébrales pourra se manifester.

2°) Les lésions génétiques

touchant à la fois la reproduction et l'hérédité, elles ont une influence sur les générations à venir et se manifestent chez des sujets qui n'ont pas été eux-mêmes exposés au toxique. D'après les travaux de RAMEL en 1971, bien que des ruptures chromosomiques puissent survenir, l'effet principal porte sur le mécanisme des fuseaux de fibres qui a la charge de la répartition des chromosomes en ensembles égaux dans les cellules filles après la division cellulaire. On sait déjà que ce mécanisme est endommagé par la présence de colchicine qui induit la formation de cellules polyploïdes ayant peu de chance de survie.

D'après RAMEL qui a étudié les phénomènes d'aberrations chromosomiques résultant de la présence de méthylmercure dans les racines d'oignons (allum Cepa) et chez la

"mouche du vinaigre" (*Drosophila melanogaster*), le méthyl-mercure rend seulement partiellement inactif le mécanisme des fuseaux de fibres et donne ainsi naissance à des répartitions erronées des chromosomes avec une aptitude de survie supérieure à celle des cellules polyploïdes. Donc, ce phénomène indique qu'il y a possibilité de désordres congénitaux tels que le mongolisme qui dépend d'une mauvaise répartition d'un chromosome déterminé : chromosome surnuméraire sur la 21^e paire.

Les conséquences de ces divisions anormales ont été bien observées chez la Drosophile dont le régime alimentaire contenait 0,05 ppm de méthyl-mercure. Tout d'abord, on notait une augmentation de la durée de gestation; quelques larves n'étaient pas viables à l'éclosion des oeufs; d'autres qui arrivaient à maturité, présentaient des incoordinations dans leurs mouvements ou parfois même des déformations de leurs ailes. Un récent rapport fait apparaître une augmentation importante du point de vue statistique, des ruptures chromosomiques dans les cellules sanguines d'êtres humains ayant consommé de fortes quantités de poisson (en moyenne 500 gr. par jour, ce qui n'est pas rare chez certaines catégories de marins-pêcheurs).

Sur la base de nos connaissances actuelles, les dommages infligés aux fonctions des nerfs et du cerveau, et les effets génétiques constituent les menaces les plus sérieuses résultant des faibles teneurs en mercure de notre environnement.

Une lacune reste à combler, c'est l'étude des effets toxicologiques synergiques du méthyl-mercure et des autres polluants de notre environnement.

-;-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2

Cette symptomatologie a pu être étudiée principalement à partir des cas d'empoisonnements de Minamata et Niigata.

A - CLINIQUE :

- engourdissement des doigts et des lèvres
- fourmillements
- troubles intermittents de l'audition
- fatigue, céphalées, insomnie.

- une ataxie, avec incoordination progressive des mouvements (marche, élocution, écriture).

- un rétrécissement du champ visuel
- une diminution des capacités intellectuelles (attention, mémoire, concentration)
- une diminution de l'acuité auditive
- des trémulations, débutant aux doigts, aux commissures labiales, de la langue, des membres, sous forme d'un fin tremblement accentué par les efforts et les émotions
- des épisodes convulsifs
- une hypersudation et un ptyalisme.

3°) après six semaines : le malade devient incapable de marcher; ses mouvements spasmodiques s'accroissent, il pousse des cris délirants. Il maigrit, ses réflexes ostéotendineux diminuent. Un état de prostration apparaît, interrompu par des épisodes convulsifs, des cris et des tremblements.

Après deux mois d'évolution, s'établit un tableau de démence comparable à celui que présentaient au siècle dernier, des chapeliers anglais intoxiqués par du mercure utilisé à la fabrication du feutre.









L'évolution terminale est très souvent la mort.

En fait, à Minamata, l'évolution mortelle a été constatée 54 fois sur les 121 cas de maladie de Minamata déclarés.

Les 67 autres cas présentaient des symptômes mal systématisés qui pouvaient facilement se confondre avec ceux d'autres pathologies; cela témoigne bien de la difficulté de diagnostic clinique précoce d'une intoxication au méthyl-mercure lorsqu'elle se présente isolée.

FREQUENCE DES SYMPTOMES CHEZ 34 CAS :

MALADES ADULTES Victimes d'empoisonnement post-natal
au METHYL-MERCURE à MINAMATA. (d'après les données de TOKUOMI)

SYMPTOMES	FREQUENCE			
	25%	50%	75%	100%
Rétrécissement du champ visuel	 40			
Diminution de l'audition	 65			
Troubles sensoriels	 90			
Ataxie { adiadococinesie troubles de la marche signe de Romberg	 80			
	 75			
	 45			
Signes extra- pyramidaux { athetose contracture chorée	 10			
	 20			
	 15			
Ptyalisme et hypersudation	 25			
Réflexes ostéo- tendineux { exagérés diminués	 7			
	 15			
Réflexes pathologiques	 15			
Troubles mentaux légers	 15			
Tremblement	 75			

B - ASPECT EVOLUTIF DE CES SYMPTOMES :

Des auteurs japonais (TOKUOMI et Col.) ont observé l'évolution des symptômes présentés par 26 malades au cours d'une période de 10 ans après le premier diagnostic d'intoxication.

- 1) Persistance de l'ataxie en ce qui concerne la marche et l'écriture.
- 2) Diminution du tremblement chez un tiers des malades.
- 3) L'affaiblissement de l'ouïe s'est amélioré chez la plupart des cas, sauf chez ceux qui avaient été atteints de surdité.
- 4) Persistance des troubles sensoriels chez 80 % des malades.
- 5) Les désordres mentaux et caractériels se sont sensiblement aggravés.

C - LES LESIONS DU POINT DE VUE ANATOMO-PATHOLOGIQUE :

Des prélèvements de substance cérébrale effectués sur des malades décédés au cours des dix années suivant leur empoisonnement, ont montré du point de vue histologique

- 1) Après une latence de 5 à 6 années, changements structuraux de la substance blanche cérébrale avec rudesse des tissus et sclérose de certaines zones.
- 2) Après une latence de dix ans et plus, dilution de la myéline et aspect dégénératif de certaines portions du cortex cérébral (en particulier les régions visuelles du cortex occipital et de la couche granulaire du cervelet).

Il est à signaler qu'aucun symptôme tant clinique qu'histologique concernant l'appareil urinaire n'a été individualisé.

II) DESCRIPTION DE LA FORME CONGENITALE DE LA MALADIE DE MINAMATA ;

L'état actuel des victimes de la forme congénitale de la maladie de Minamata a été examiné : sur les 121 malades à Minamata, 22 l'étaient congénitalement et 2 décédèrent plus tard.

La maladie dans sa forme congénitale est caractérisée par des symptômes comparables à ceux d'une paralysie infantile d'origine cérébrale associant :

- 1) un retard de développement psycho-moteur, de l'élocution
- 2) des troubles moteurs, une ataxie
- 3) des troubles de la mastication, de la déglutition et de la salivation
- 4) parfois une atteinte des nerfs optiques, pouvant conduire à une cécité.

Ces malades ont maintenant entre quinze et vingt ans.

- L'ataxie et les troubles de la parole se sont maintenus dans presque tous les cas.
- Ceux qui souffraient de troubles de la mastication et de la déglutition se sont rétablis dans la moitié des cas environ.
- Les mouvements involontaires et les réflexes pathologiques se sont atténués, mais chez la plupart, les troubles moteurs ont persisté.

Des caryotypes effectués chez ces enfants et chez leurs mères ont permis de constater l'intégrité des chromosomes.

Quant à la teneur en mercure de leurs cheveux, elle était à un taux considéré comme normal ($< 5 \mu\text{g/g}$).

Bien que les mères de ces enfants congénitalement atteints eussent absorbé des quantités importantes de mercure pendant leur grossesse, aucun symptôme caractéristique de l'intoxication ne fut observé chez elles. Cela témoigne de l'extrême sensibilité du fœtus et du nouveau-né à l'empoisonnement méthyl-mercuriel, peut être à cause de son faible poids et d'un facteur de concentration du méthyl-mercure plus élevé chez lui que chez l'adulte.

III) POSSIBILITES DE DIAGNOSTIC D'UN TEL EMPOISONNEMENT :

A - Du point de vue des symptômes cliniques :

C'est pratiquement impossible vue la diversité de ces symptômes et leurs caractères non systématisés. De même, les effets cumulatifs à long terme ou d'autres dommages sub-cliniques ne peuvent être diagnostiqués précocément.

B - Du point de vue biologique :

Les meilleurs indices, disponibles actuellement, d'exposition d'un organisme humain au méthyl-mercure, sont la teneur en composés du mercure, des cheveux et du sang.

Dans les urines, le dosage du méthyl-mercure ne constitue pas un bon témoin car il n'existe aucune corrélation entre la teneur urinaire et le degré d'empoisonnement. Par ailleurs, une atteinte même minime de la fonction rénale, peut réduire, voire supprimer, cette élimination.

a) Les méthodes de dosage :

1°) Les méthodes chimiques, basées sur la formation d'un complexe extractible en milieu acide par le chloroforme qu'il colore en rose, en présence d'un dérivé de la dithizone (la β naphtylthiocarbazone). Cette réaction colorimétrique s'effectue généralement sous reflux pour éviter les pertes par chauffage dues à la volatilité du mercure.

Mais la sensibilité de ces méthodes est moyenne, précision de 5 %.

2°) Les méthodes physiques. La méthode la plus utilisée et la plus précise est l'absorption atomique sans flamme. Elle utilise un spectrophotomètre équipé d'une lampe à cathode creuse de mercure et d'un enregistreur. Elle consiste à mesurer l'absorption par le mercure réduit à l'état de vapeur, d'un rayon lumineux convenablement choisi (le mercure retient sélectivement la raie de résonance 2,536 Å). La densité optique mesurée est en relation directe avec la concentration. Le passage du mercure se traduit sur le graphique enregistreur par un pic dont la hauteur est proportionnelle à la concentration.

b) Les résultats :

Grâce à cette méthode, BIRKE a pu définir que pour les maladies de Minamata, les teneurs en méthyl-mercure dans leurs cheveux variaient entre 50 et 200 $\mu\text{g/g}$. Mais personne n'a pu définir le seuil à partir duquel apparaissent les symptômes de l'intoxication.

La teneur en mercure la plus faible du sang complet dont on admet qu'elle ait provoqué des symptômes neurologiques, sur la base de nos techniques de diagnostic existantes a été de 0,2 $\mu\text{g/g}$.

Selon Jun U I, d'après les dosages en méthyl-mercure du sang et des cheveux des malades de Minamata, il y aurait une équivalence entre l'ingestion de méthyl-mercure et sa concentration dans le sang total. Par ailleurs, le rapport entre la concentration en méthyl-mercure des corpuscules du sang et du plasma serait le plus fidèle indicateur d'une éventuelle intoxication au méthyl-mercure.

c) L'intérêt du diagnostic biologique :

Il est très discutable, car aucune dose seuil d'empoisonnement ne peut être définie réellement, car elle devrait tenir compte :

- des prédispositions individuelles (dépendant du régime alimentaire, de facteurs constitutionnels par exemple).
- du mode d'intoxication.

En fait, il n'a qu'un caractère prémonitoire, permettant, à condition d'effectuer des contrôles répétés, de détecter biologiquement tout début d'empoisonnement ou toute limite critique.

[illegible]

de A à H : Sujets ayant été à des degrés variés exposés au méthyl-mercure par la consommation de poissons.

IV) TRAITEMENT A ENTREPRENDRE AUX PREMIERS SOUPCONS :

Son but va être la neutralisation du toxique et son élimination. En fait, il n'existe aucun traitement spécifique contre le méthyl-mercure. Ceux utilisés dans les diverses épidémies d'empoisonnement avaient seulement pour effet de réduire la teneur du toxique au niveau sang et rénal et de diminuer les symptômes neurologiques.

A - Réduction de la teneur en méthyl-mercure du sang :

En essayant par voie intraveineuse l'hyposulfite de sodium, des réducteurs énergiques comme la rongalite (mélange formal-déhyde-sulfoxylate de sodium), le B.A.L. (British anti-lewisite) ou par des dérivés organiques comme l'E.D.T.A. (acide éthylène diamine tétracétique). Cette dernière substance a des propriétés chélatrices qui lui permettent de fixer "in vivo" certains métaux toxiques (dont le mercure) sans entraîner de troubles métaboliques.

B - Atténuer la symptomatologie neurologique :

Surtout le tremblement en utilisant des antiparkinsoniens comme le Parsidol, la Scopolamine.

-:-

[illegible]

Il existe de nombreux processus par lesquels le mercure peut devenir concentré localement dans notre environnement. La concentration du méthyl-mercure dans les espèces aquatiques de notre chaîne alimentaire est l'un des principaux.

Pour avoir une idée de l'importance de la pollution mercurielle actuelle du territoire français, et afin de pouvoir évaluer les risques d'intoxication d'éventuels consommateurs de produits de la pêche, il nous a paru utile d'insérer dans ce travail les études engagées et poursuivies actuellement à l'Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes de Nantes. Ces études portent sur les analyses de teneur en méthyl-mercure de quelques poissons de consommation courante et de moules du littoral français.

1999	2	1999	3	1999	4	1999	5	1999	6	1999	7	1999	8	1999	9	1999	10	1999	11	1999	12	1999	13	1999	14	1999	15	1999	16	1999	17	1999	18	1999	19	1999	20	1999	21	1999	22	1999	23	1999	24	1999	25	1999	26	1999	27	1999	28	1999	29	1999	30	1999	31	1999	32	1999	33	1999	34	1999	35	1999	36	1999	37	1999	38	1999	39	1999	40	1999	41	1999	42	1999	43	1999	44	1999	45	1999	46	1999	47	1999	48	1999	49	1999	50	1999	51	1999	52	1999	53	1999	54	1999	55	1999	56	1999	57	1999	58	1999	59	1999	60	1999	61	1999	62	1999	63	1999	64	1999	65	1999	66	1999	67	1999	68	1999	69	1999	70	1999	71	1999	72	1999	73	1999	74	1999	75	1999	76	1999	77	1999	78	1999	79	1999	80	1999	81	1999	82	1999	83	1999	84	1999	85	1999	86	1999	87	1999	88	1999	89	1999	90	1999	91	1999	92	1999	93	1999	94	1999	95	1999	96	1999	97	1999	98	1999	99	1999	100	1999	101	1999	102	1999	103	1999	104	1999	105	1999	106	1999	107	1999	108	1999	109	1999	110	1999	111	1999	112	1999	113	1999	114	1999	115	1999	116	1999	117	1999	118	1999	119	1999	120	1999	121	1999	122	1999	123	1999	124	1999	125	1999	126	1999	127	1999	128	1999	129	1999	130	1999	131	1999	132	1999	133	1999	134	1999	135	1999	136	1999	137	1999	138	1999	139	1999	140	1999	141	1999	142	1999	143	1999	144	1999	145	1999	146	1999	147	1999	148	1999	149	1999	150	1999	151	1999	152	1999	153	1999	154	1999	155	1999	156	1999	157	1999	158	1999	159	1999	160	1999	161	1999	162	1999	163	1999	164	1999	165	1999	166	1999	167	1999	168	1999	169	1999	170	1999	171	1999	172	1999	173	1999	174	1999	175	1999	176	1999	177	1999	178	1999	179	1999	180	1999	181	1999	182	1999	183	1999	184	1999	185	1999	186	1999	187	1999	188	1999	189	1999	190	1999	191	1999	192	1999	193	1999	194	1999	195	1999	196	1999	197	1999	198	1999	199	1999	200	1999	201	1999	202	1999	203	1999	204	1999	205	1999	206	1999	207	1999	208	1999	209	1999	210	1999	211	1999	212	1999	213	1999	214	1999	215	1999	216	1999	217	1999	218	1999	219	1999	220	1999	221	1999	222	1999	223	1999	224	1999	225	1999	226	1999	227	1999	228	1999	229	1999	230	1999	231	1999	232	1999	233	1999	234	1999	235	1999	236	1999	237	1999	238	1999	239	1999	240	1999	241	1999	242	1999	243	1999	244	1999	245	1999	246	1999	247	1999	
------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	--

00010

Espèce	Origine	Nbre échan- till- lons	Min.	Max.	Moy.	Dates de Pêche
scasses, grondin sébasté	Mer du Nord	20	0,03	0,32	0,154	Novembre 1971 Mars, Avril et Juin 1972
	Atlantique côte franc.	2	0,06	0,07	0,065	Février 1972
	Méditerranée côte franc.	5	0,03	0,21	0,125	Février, Mars 1972
aurade, pagre anthare picarel, puget, chinchard, alet et vive	Atlantique côte franc. et Manche	10	0,02	0,12	0,073	Janvier et Février 1972
	Méditerranée côte franc.	27	0,04	1,05	0,331	Mars 1971 Février et Mars 1972
squereau	Mer du Nord	5	0,01	0,20	0,072	Janvier et Décembre 1971
	Atlantique côte franc.	2	0,04	0,05	0,045	Mars 1971
	Méditerranée côte franc.	2	0,31	0,34	0,325	Février 1972
thon rouge	Méditerranée	4	0,73	0,82	0,765	Pêchés en Mars 1972
poissons plats sardine, sole, plie, alet, limande)	Mer du Nord	44	0,04	0,35	0,106	Novembre 1971 Février, Mars et Avril 1972
	Atlantique côte franc.	3	0,05	0,07	0,058	Février 1972
	Méditerranée côte franc.	4	0,03	0,08	0,06	Février 1972

I) TENEUR EN MERCURE DE POISSONS CONSOMMES
COMMUNEMENT EN FRANCE :

A - Les méthodes d'analyse :

Il faut avoir recours à des techniques très sensibles car la quantité présumée est de l'ordre d'une centaine de partie par milliard (0,1 mg/kg). En outre, le mercure et ses sels sont très volatiles de sorte que si l'on ne manipulait pas à basse température, une partie serait perdue.

Les poissons sont coupés en fins morceaux, puis mélangés pour constituer un échantillon moyen. Les prélèvements sont homogénéisés au mixeur. Deux grammes de pâte ainsi constituée sont dissous dans 10 ml d'acide sulfurique en chauffant à 50° pendant 2 heures. Après refroidissement, sont ajoutées goutte à goutte 40 ml de solution à 6 % de permanganate de potassium. Le minéralisat est abandonné 12 heures; une solution de sulfate stanneux en milieu acide est versée afin de réduire les ions Hg^{2+} en Hg^0 . La vapeur de mercure est entraînée par un courant d'air dans une cellule à fenêtres de quartz, interposé sur le trajet d'un faisceau lumineux de longueur d'onde de 254 nm (spectrophotométrie). La densité optique mesurée est en relation directe avec la concentration. La variation de densité optique est enregistrée; le passage du mercure se traduit sur le graphique par un pic de hauteur proportionnelle à la concentration.

B - Poissons frais ou congelés :

Chaque échantillon examiné provenait de 5 à 6 poissons sur lesquels on a préparé un homogénéisat. Les résultats portés sur le tableau font apparaître que les valeurs sont homogènes pour une espèce donnée et une provenance définie (anchois, sardines). Ceci semble indiquer qu'une même espèce vivant dans le même milieu accumule le mercure d'une manière similaire. Par contre, des différences notables sont observées pour une espèce donnée suivant les lieux de pêche (merlu, sardine, anchois). Il y a donc des régions plus contaminées les unes que les autres : la côte méditerranéenne paraît plus polluée que l'Atlantique (golfe de Gascogne) et que la Manche.

I) TENEUR EN MERCURE DE POISSONS CONSOMMES
COMMUNEMENT EN FRANCE :

A - Les méthodes d'analyse :

Il faut avoir recours à des techniques très sensibles car la quantité présumée est de l'ordre d'une centaine de partie par milliard (0,1 mg/kg). En outre, le mercure et ses sels sont très volatiles de sorte que si l'on ne manipulait pas à basse température, une partie serait perdue.

Les poissons sont coupés en fins morceaux, puis mélangés pour constituer un échantillon moyen. Les prélèvements sont homogénéisés au mixeur. Deux grammes de pâte ainsi constituée sont dissous dans 10 ml d'acide sulfurique en chauffant à 50° pendant 2 heures. Après refroidissement, sont ajoutés goutte à goutte 40 ml de solution à 6 % de permanganate de potassium. Le minéralisat est abandonné 12 heures; une solution de sulfate stanneux en milieu acide est versée afin de réduire les ions Hg^{2+} en Hg^0 . La vapeur de mercure est entraînée par un courant d'air dans une cellule à fenêtres de quartz, interposé sur le trajet d'un faisceau lumineux de longueur d'onde 254 nm (spectrophotométrie). La densité optique mesurée est en relation directe avec la concentration. La variation de densité optique est enregistrée; le passage du mercure se traduit sur le graphique par un pic de hauteur proportionnelle à la concentration.

B - Poissons frais ou congelés :

Chaque échantillon examiné provenait de 5 à 6 poissons sur lesquels on a préparé un homogénéisat. Les résultats portés sur le tableau font apparaître que les valeurs sont homogènes pour une espèce donnée et une provenance définie (anchois, sardines). Ceci semble indiquer qu'une même espèce vivant dans le même milieu accumule le mercure d'une manière similaire. Par contre, des différences notables sont observées pour une espèce donnée suivant les lieux de pêche (merlu, sardine, anchois). Il y a donc des régions plus contaminées les unes que les autres : la côte méditerranéenne paraît plus polluée que l'Atlantique (golfe de Gascogne) et que la Manche.

Plusieurs auteurs ont montré que chez une espèce donnée pêchée en un lieu donné, les teneurs en mercure augmentent avec l'âge. Ceci a été confirmé par des analyses faites sur des thons et des squales, et s'explique par le fait que plus les poissons, qui se nourrissent de leurs congénères ou de mollusques, sont vieux, plus grand a été leur contact avec des polluants comme le méthyl-mercure qui se sera fixé à leurs protéines et ne s'en éliminera que très lentement.

C - Poissons en conserve :

On peut se demander ce qu'il advient du mercure lorsque le poisson est mis en conserve (cas du thon par exemple). Des dosages effectués avant et après l'opération d' "appertisation" indiquent que le mercure se maintient dans le poisson : mais ce que l'on ignore, c'est s'il y a modification dans le pourcentage en méthyl-mercure par rapport au mercure métal durant le processus de conservation.

D - Conséquences :

En récapitulant l'ensemble des données, les résultats se situent entre 0,015 et 0,33 ppm. Même dans les plus mauvais cas, ils sont inférieurs aux doses et normes qui ont été annoncées comme dangereuses (0,5 ppm) dans les pays les plus sévères au point de vue de l'établissement de normes de sécurité (Canada et Etats-Unis).

II) TENEUR EN MERCURE DES MOULES DU LITTORAL FRANCAIS :

A - Raisons du choix de ces mollusques :

Ces coquillages sont de très bons indicateurs de la contamination des eaux pour plusieurs raisons,

· 1°) il s'agit d'un des fruits de mer le plus fréquemment consommé,

· 2°) ces mollusques sont des coquillages communs à toutes nos côtes, et on peut ainsi parfaitement localiser la pollution.

· 3°) leur mode de vie les amène à filtrer d'importantes quantités d'eau de mer; elles tirent leur substance du plancton microscopique de l'eau qu'elles filtrent au rythme de 2 litres par heure.

· 4°) à cause de leur affinité pour les protéines, elles retiennent et concentrent tous les métaux lourds présents dans l'eau de mer.

· 5°) il a été démontré :

- a- que le mercure se fixe sur les groupements sulfhydriles des protéines d'une manière telle que son élimination est lente.
- b- qu'un équilibre va s'établir entre la quantité de mercure présente dans l'eau et celle fixée par le mollusque, si les phénomènes d'accumulation et d'élimination se poursuivent assez longtemps : un tel équilibre est vraisemblablement réalisé chez la moule dont la durée de vie atteint une dizaine d'années.

B - Echantillonnage :

Pour que l'échantillon soit au mieux représentatif de la contamination locale, les prélèvements de moules ont été effectués :

- 1) dans les gisements naturels et parcs (moules de culture)
- 2) sur les lieux où elles prolifèrent naturellement (moules sauvages).

Elles ont été prélevées sur les rochers des bords de mer, des embouchures ou dans les ports sur les digues et les estacades.

Chaque échantillon comprenait de 60 à 80 moules de 3 à 6 cm.

Les moules qui parvenaient vivantes au laboratoire, étaient gardées au congélateur à -20° jusqu'à l'analyse.

C - Méthode d'analyse :

C'est la méthode "d'absorption atomique sans flamme" à l'aide d'un spectrophotomètre qui a été utilisée.

A leur sortie du congélateur, les moules ont été ouvertes, égouttées et la chair crue a été prélevée puis homogénéisée. Après destruction de la substance organique et réduction du mercure à l'état métallique, la méthode a consisté à mesurer la quantité de lumière absorbée par la vapeur de mercure passant devant un rayon lumineux de longueur d'onde 254 nm.

D - Les résultats :

D'après le tableau des teneurs en mercure de moules prélevées, on constate :

- 1°) pour un même lieu de prélèvement, les teneurs en mercure des moules sont identiques aux différentes saisons.
- 2°) par contre, des différences apparaissent nettement en fonction des lieux de prélèvement, ce qui est bien mis en évidence par les teneurs moyennes annuelles.
- 3°) comme pour les poissons, on constate que la teneur moyenne est assez faible (0,06 mg/kg) le long des côtes de la Mer du Nord, de la Manche et de l'Atlantique, comparativement à celles retrouvées le long des côtes méditerranéennes (0,15 mg/kg).
- 4°) les teneurs rencontrées dans les ports et les embouchures sont plus élevées; celles-ci s'expliquent vraisemblablement dans les ports par les souillures dues à la présence et à l'activité des bateaux, tandis que dans les estuaires, elles se justifient par les déversements des usines et des villes qui bordent les cours d'eau : il en est ainsi de Boulogne sur Mer, de l'embouchure de la Seine, du port de Morlaix, de Douarnenez, de l'Ile Madame à l'embouchure de la Charente, du golfe de Fos (déversement des eaux du Rhone et activité industrielle locale) et du port de Toulon (souillures dues à l'Arsenal ?).

Quant à la teneur élevée (0,19 mg/kg) trouvée dans les échantillons originaux de l'embouchure de la Bidassoa à la frontière franco-espagnole, elle ne s'explique pas a priori, mais une origine industrielle n'a pas été retrouvée, mais doit être suspectée.

TENEUR EN MERCURE DES MOULES
PRELEVEES SUR LE LITTORAL FRANCAIS

- : - : - : - : - : - : -

LIEU de prélèvement	Mercure en mg/kg de chair égouttée			
	Février 72	Juin 72	Octobre 72	Moyenne pondérale annuelle
1 DUNKERQUE	0,03	0,06	0,06	0,05
2 SANGATTE				0,08
3 BOULOGNE S/MER		0,09	0,09	0,09
4 LE TREPORT	0,01	0,06	0,05	0,04
5 FECAMP		0,09	0,08	0,085
6 Embouchure SEINE	0,13		0,11	0,12
7 LUC S/MER		0,10	0,05	0,09
8 SAINTE-MARIE- du MONT		0,03	0,03	0,023
9 SAINT-VAST-la- HOUGUE		0,06	0,07	0,06
10 SAINT-BRIEUC		0,02		0,02
11 LANNION PERROS-GUIREC				0,06
12 TREBEURDEN	0,02	0,06	0,04	0,04
13 TREGASTEL	0,08	0,04	0,05	0,04

LIEU de prélèvement	Mercure en mg/kg de chair égouttée			
	Février 72	Juin 72	Octobre 72	Moyenne pondérale annuelle
14 MORLAIX	0,09	0,10	0,09	0,94
15 GOULLVEN	0,01	0,02	0,03	0,02
16 CAMARET	0,01	0,02	0,02	0,015
17 DOUARNENEZ	0,04	0,16	0,14	0,10
18 LE POULDU			0,03	0,035
19 PORT NAVALO		0,04	0,04	0,03
20 Embouchure de LA VILAINE	0,01	0,03	0,02	0,02
21 Embouchure de LA LOIRE				0,01
22 NOIRMOUTIER		0,03	0,07	0,04
23 BRETIGNOLLES S/MER		0,05		0,05
24 BAIE DE L'AIGUILLON		0,07	0,09	0,06
25 Ile MADAME		0,09	0,09	0,08
26 Embouchure de LA GIRONDE	0,06	0,05	0,04	0,05
27 Bassin d'ARCACHON	0,09		0,08	0,09
28 Embouchure de la BIDASSOA	0,22	0,24		0,195
29 Etang de LEUCATE		0,04	0,16	0,08
30 Etang de THAU		0,05	0,03	0,025

LIEU de prélèvement	Mercure en mg/kg de chair égouttée			
	Février 72	Juin 72	Octobre 72	Moyenne pondérale annuelle
31 Golfe de FOS	0,23	0,29	0,24	0,25
32 TOULON	0,31		0,31	0,30
33 SAINT-TROPEZ			0,06	0,06

E - Les conséquences :

Ces résultats indiquent que la contamination des côtes françaises par le mercure est assez faible et lorsqu'il y a contamination sensible, elle est très localisée. Ainsi dans la rade de Toulon où on a effectué des prélèvements sur des moules de parcs d'élevage qui sont à peine contaminés, alors que celles qui prolifèrent sur les quais des darses de l'arsenal ont, du fait des souillures des ateliers, des teneurs très élevées (un prélèvement opéré sur une vieille coque de navire a révélé une teneur de 5 mg/kg). La raison en est vraisemblablement la présence de sels de mercure utilisés comme "antifouling" dans la peinture de la coque.

Il semble donc, en ce qui concerne les coquillages, que les risques de contamination mercurielle soient très faibles. Toutefois, il est à déconseiller, notamment aux vacanciers, de faire la "cueillette" de ces mollusques sauvages dans les ports et les estuaires où les teneurs en méthyl-mercure peuvent être inquiétantes pour la santé des consommateurs.

Mais pour essayer de définir les risques d'intoxication mercurielle par ingestion de produits de la mer pollués, il ne suffit pas de passer en revue les résultats retrouvés le long de notre littoral. Il ne faut pas omettre qu'une forte quantité de moules est importée dans notre pays. Le premier importateur est la Hollande qui nous fournit le tiers de sa production, soit près de 37 000 tonnes de moules; puis viennent l'Angleterre et le Danemark.

Donc, pour compléter cette étude, il nous a paru indispensable d'analyser les teneurs en mercure de moules prélevées :

I) Sur le littoral hollandais :

Sur 22 relevés effectués, ont été trouvées :

- 4 teneurs $< 0,10$ mg/kg de chair égouttée (côte de la frontière belge à Rotterdam).
- 13 teneurs comprises entre 0,10 et 0,20 mg/kg.

- 5 teneurs $>0,20$ mg/kg principalement dans le zône du Zuydersée.

A l'embouchure de l'EMS (frontière Hollande-Allemagne) un relevé a été de $0,83$ mg/kg.

2) Au Danemark :

Les relevés (15 au total) ont montré des teneurs inférieures à $0,10$ mg/kg.

3) En Angleterre :

Les relevés montrent des teneurs assez élevées souvent comprises entre $0,10$ et $0,20$ mg/kg, avec de fortes teneurs $>0,30$ mg/kg dans les ports de Portsmouth, Brighton, Douvres et Edimbourg.

Ces résultats montrent bien que, si en France quelques rares teneurs sont significatives d'un apport indésirable pour l'avenir du milieu marin et la santé des consommateurs, il n'en est pas de même en Hollande et en Angleterre, où ces teneurs sont inquiétantes à double titre :

- il s'agit de grands exportateurs de moules vers nos marchés.
- aucune mesure réglementant les normes de salubrité de ces coquillages n'a été envisagée dans ces deux pays en ce qui concerne leur teneur en mercure.

~:~

[illegible]

- celui des contrôles et de la réduction des rejets industriels de mercure sous toute forme.
- celui du contrôle de la salubrité de nos aliments.

Diverses possibilités d'intervention préventive peuvent se concevoir :

1°) en appliquant d'autres procédés de remplacement
aussi efficaces.

2°) en diminuant la production et la consommation de
mercure.

En favorisant par exemple la recherche de composés possédant les mêmes propriétés; c'est ainsi qu'en art dentaire, on tend de plus en plus pour les obturations dentaires,

à remplacer les amalgames par des résines acryliques et époxydes. On pourrait par exemple dans l'optique de remplacer les instruments de mesure au mercure, favoriser la recherche de systèmes "infra-rouge" thermo-sensibles.

B - Augmentation de l'efficacité d'emploi du mercure :

1°) en rendant les mêmes procédés de fabrication plus propres.

Depuis plus d'un siècle, nos connaissances chimiques nous permettent de retirer le mercure des solutions. On peut par exemple précipiter du mercure en présence d'hydrogène sulfuré. Ce précipité pourra fort bien par grillage, fournir à nouveau du mercure, au même titre que dans le procédé d'extraction du métal à partir du "cinabre". On peut concevoir une séparation du mercure par échangeurs d'ions ou sa réduction en mercure métallique suivie d'extraction au travers de carbone actif.

2°) par recyclage.

a- des effluents industriels, ce qui va permettre de récupérer une eau "propre", mais aussi des éléments valorisables qu'elle contenait.

b- des piles, des instruments de contrôle, des appareils électriques contenant du mercure, en suggérant leur récupération et en évitant leur réduction par le feu.

C - Etablissement d'une réglementation :

Les rejets actuels dans l'environnement, estimés à plus de 4 000 tonnes de mercure par an pour l'ensemble du globe, pourrait être accrus si une réglementation d'utilisation du mercure n'était envisagée pour les limiter notamment dans les pays les plus industrialisés qui sont les principaux pollueurs.

1) en obligeant les industriels à déclarer les quantités de mercure utilisé et consommé afin de prévoir les rejets réels.

2) en augmentant par exemple les primes d'assurance couvrant les risques de pollution et même en excluant ces risques dans

certaines circonstances, ce qui aiderait à modifier certaines pratiques industrielles en matière de pollution.

- 3) en établissant des actions légales à l'encontre d'industries rejetant des effluents non conformes à des normes pré-établies.

II) ETABLISSEMENT DE NORMES DE SALUBRITE DES PRODUITS DE LA PECHE VIS-A-VIS DES POLLUANTS MERCURIELS.

A - Les raisons :

Nous avons appris que les intoxications mercurielles observées chez l'homme étaient principalement dues à l'ingestion d'aliments contaminés, et surtout de fruits de mer.

Compte tenue de l'importance de la population halieutique et de sa place dans notre alimentation, il est essentiel à partir de cette denrée, d'établir des concentrations maximales tolérables et des normes de salubrité pour assurer la prévention de toute intoxication alimentaire et par là même, sauvegarder notre santé.

Puisque à l'état normal, notre organisme contient de faibles traces de mercure et qu'il y en a dans notre environnement, jusque dans les aliments que nous consommons quotidiennement, cela ne signifie pas forcément un danger pour notre santé. En fait, tout dépend de la quantité que nous ingérons. Lorsqu'il s'agit dans un but préventif de fixer des normes pour définir où s'arrête le tolérable et où commence le toxique, les avis diffèrent. C'est ainsi que les gouvernements des pays industrialisés plus ou moins impliqués dans cette pollution, ont établi des normes qui divergent dans leur conception et dans leur taux, plus souvent d'ailleurs dans une optique économique que sanitaire.

B - Les difficultés dans l'établissement de ces normes :

Elles naissent de plusieurs faits :

- I°) certains pays, ne tenant nullement compte de considérations propres à la santé d'éventuels consommateurs, fixent des nor-

mes assez élevées comparativement aux autres états pour préserver leur économie de la pêche et favoriser les professions vivant des ressources de la pêche.

- 2°) la quantité de méthyl-mercure contenue dans les aliments et détruite ou transformée en mercure métal, en lui-même inoffensif, lors de la cuisson de ces aliments n'a pu être évaluée
- 3°) la fixation d'un coefficient de sécurité dans l'établissement de ces normes n'est qu'arbitraire. Il permet cependant de pallier à notre ignorance de certains processus évolutifs de l'intoxication mercurielle (appréciation du risque de conséquences génétiques, difficulté d'apprécier les sensibilités individuelles au méthyl-mercure), et permet l'établissement de normes fiables du point de vue salubrité.

III) BILAN DES MESURES PROPHYLACTIQUES JUSQU'ICI PUBLIEES ET ETABLIES DANS LE MONDE :

L'efficacité de telles mesures préventives peut s'apprécier d'après le système de contrôle qui est déjà entrepris dans cinq pays industrialisés.

A - En Suède :

I°) sur le plan industriel :

- interdiction absolue de l'utilisation de produits mercuriels dans l'industrie des pâtes et papiers et en agriculture.
- réduction obligatoire des effluents d'usines de chlore et de soude utilisant des électrodes au mercure.
- création d'un office national des poisons et pesticides surveillant tout produit mercuriel commercialisé.

2°) du point de vue hygiène alimentaire :

Création de l'Administration Nationale pour la protection de l'environnement qui contrôle les taux de mercure des lots de poissons destinés à la consommation.

Les chercheurs et toxicologues suédois qui se trouvent chez eux en présence d'une population forte consommatrice de poisson ont, à partir des données épidémiologiques japonaises, établi leurs normes de la façon suivante :

- a- sachant que des concentrations de mercure total de $0,02 \mu\text{g/g}$ dans le sang complet et de $60 \mu\text{g/g}$ dans les cheveux peuvent annoncer l'apparition de symptômes d'empoisonnement au mercure chez l'homme.
- b- considérant que ces teneurs sont atteintes avec une absorption quotidienne de $0,3 \text{ mg}$ de méthyl-mercure pour un homme moyen (65 kg).
- c- en retenant un facteur de sécurité de 10 justifiable par la vulnérabilité de certains individus, les sensibilités individuelles différentes au méthyl-mercure, les conséquences imprévisibles sur le fœtus et le matériel génétique.

On arrive ainsi à une absorption journalière admissible de $0,03 \text{ mg}$ de méthyl-mercure. En prenant une concentration en polluant maximale de 1 ppm (norme en vigueur dans ce pays), on en déduit que la consommation hebdomadaire de l'homme de poids moyen, ne doit pas dépasser 210 grammes. En terme concret, cela représente deux repas de poisson par semaine; cela semble bien loin de la réalité : le suédois consomme en moyenne 40 g de poisson par jour; certains pêcheurs consomment jusqu'à 300 g par jour.

B - Au Japon :

- interdiction de l'utilisation de fongicides mercuriels dans les peintures.
- prescription de l'emploi des pesticides mercuriels en agriculture, sauf pour traiter les graines de semences.
- considérant le nombre de sources possibles de mercure, les autorités japonaises ont mis au point un système de prévention des intoxications. On analyse d'abord les effluents de toute usine susceptible de polluer les rivières : si ceux-ci contiennent plus de 1 ppm de mercure total, une analyse de la chair des poissons de la rivière est décidée. Si plus de

20 % des échantillons de poisson a une teneur supérieure à 1 ppm, ou si des poissons de teneurs > 10 ppm sont trouvés, la rivière est considérée comme polluée. Dans ce cas, on réalise une enquête rapide sur les habitudes alimentaires de la population et on détermine la teneur en mercure des cheveux des personnes apparaissant avoir été les plus exposées. Si cette teneur est supérieure à 20 ppm, un examen neurologique est entrepris. Si la teneur atteint 70 ppm, le sujet est placé en observation dans un centre médical, car il y a une forte probabilité d'intoxication latente.

Ces diverses opérations de contrôle sont réalisées par l'Agence contre la pollution de l'environnement qui dispose d'une centaine de centres de contrôle biologique d'échantillons d'aliments.

La norme est établie à 1 ppm pour le poisson à la vente.

C - Au Canada et aux Etats-Unis :

- procès intentés systématiquement contre toute industrie évacuant du mercure dans ses rejets.
- radiation de l'homologation de tout produit mercuriel utilisé en agriculture.
- interdiction formelle d'utiliser pour les produits alimentaires des emballages de carton ou papier traités avec des dérivés mercuriels.
- la "food and drug administration" mène des enquêtes annuelles sur les denrées alimentaires pour déterminer le taux résiduel de substance toxique.
- fermeture des zones de pêche dans les grands lacs et destruction de tout produit de la pêche dépassant le taux prescrit comme maximum.
- un programme d'inspection nationale a été établi dans une loi sur les pêcheries, garantissant la salubrité des produits de la pêche mis sur le marché.

La norme a été fixée à 0,5 ppm.

D - Le comité mixte FAO/OMS :

d'experts des additifs alimentaires utilise une procédure différente et d'emblée à appliquer un facteur de sécurité de 100, ainsi on obtient une norme de 0,05 ppm très voisine de la teneur naturelle et donc peu concevable au niveau de chaque pays.

E - L'Italie :

seule, soucieuse de sauvegarder ses intérêts économiques, sans envisager les conséquences possibles d'une contamination élevée de ses propres ressources halieutiques, dicte une norme de 0,7 ppm qui ne frappe que le poisson importé.

F - En France :

la lutte anti-pollution est régie par une loi de 1964. Mais c'est surtout depuis la création en 1971 d'un Ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement que des lois réglementent le déversement et l'épandage de tout effluent industriel.

Cependant, aucune interdiction d'emploi de composés mercuriels aussi bien dans l'industrie que dans l'agriculture n'a été promulguée.

En ce qui concerne l'hygiène alimentaire, notamment en matière de produits de la pêche, deux organismes officiels, l'I.S.T.P.M. et le Laboratoire Central de recherche vétérinaire d'Alfort effectuent des contrôles analytiques sur les lots de poissons pêchés par nos marins-pêcheurs, mais aussi sur les lots importés. C'est de cette façon en 1971 que près de 1 500 tonnes de thon congelé importé n'a pas obtenu l'étiquette de salubrité. En 1972, ce sont 100 000 boîtes de conserves de thon qui ont été déclarées impropres à la consommation et refoulées hors de France.

Après plus de 5 000 dosages de mercure réalisés à ce jour sur divers produits de la pêche, il a été constaté que la moyenne de l'ensemble des résultats était inférieure à la norme retenue en France : 0,7 ppm.

Cette norme n'a été établie qu'à titre provisoire en accord avec la Direction de la Marine Marchande et le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique. Elle a été calculée en fonction de la norme en vigueur aux Etats-Unis en sachant que la consommation française de thon représente les 2/3 de celle des Etats-Unis.

Ces données permettent peut être de rassurer les consommateurs français, mais conduisent aussi à penser qu'il est indispensable de développer nos moyens de contrôle pour suivre l'évolution du niveau en mercure de toute notre alimentation.

- ; -

Chlorophyll

Mais les concentrations qui ont été dosées dans les poissons et les coquillages des côtes de France, ne sont pas suffisamment élevées pour provoquer des intoxications aiguës.

Au contraire, des données épidémiologiques et toxicologiques ont fait ressortir que seules des concentrations très faibles en méthyl-mercure pourraient à long terme nous permettre une consommation ad libitum de poissons sans risque d'intoxication chronique.

- 58 -

Tant que la concentration minimale tolérable en méthyl-mercure n'aura pas été définie avec précision, ce risque existe.

Et pour le supprimer, nous sommes placés devant une alternative :

- ou bien nous contrôlons sévèrement les pollutions marines en mercure, et il devient possible de consommer sans danger n'importe quelle quantité de poissons et de coquillages.
- ou bien nous ne sommes pas capables de limiter les pollutions en mercure, et, dans ce cas, pour préserver notre santé et celle de nos enfants, nous ne devons pas dépasser une absorption hebdomadaire de 300 grammes de poissons ou de coquillages (valeurs proposées par le Professeur BRISOU - Janvier 1973).

Si l'on considère l'importance sociale de l'absorption des produits de la mer, si l'on réalise la gravité des équilibres économiques basés sur cette consommation, on est inéluctablement conduit à une conclusion :

Tout doit être mis en oeuvre pour instaurer une surveillance minutieuse de l'environnement marin.

Ce n'est pas payer trop cher une assurance à la santé pour nous-mêmes et les générations qui nous succéderont.

~ : ~ : ~ : ~ : ~

[illegible]

- 60

- 8 - BIRKE G.
Studies on humans exposed to methylmercury through fish consumption.
Arch. Environ. Health, Août 1972, 25, 77/91.
- 9 - BLOCK J.B.
Mercury pollution, a fish story.
J.Ky Med. Ass, Novembre 1971, 69, 861/863.

Mercury, a water pollutant of concern but not alarm.
N. England. J. Med., 13 Avril 1972, 286, 840/842.
- 10 - BRISOU et STONS.
Revue "QUE CHOISIR" de l'Union Française des consommateurs.
Janvier 1973, N° 72, P. 3 - 13.
- 11 - BROWN J.R. and KULKARNI M.V.
A review of the toxicity and metabolism of mercury and its compounds.
Med Services Journal CANADA, May 1967, 23 P. 786/808.
- 12 - CHEVALIER R., PAIRAIN R.
Mesure de la toxicité des pollutions en milieu aquatique;
Science et pêche, Bull. Inst. Pêches Marit., Janvier 1968, N° 166,
P. 1 à 9.
- 13 - CLARA F.
Le mercure est-il une menace de plus pour l'humanité ?
Med. Hyg., 17 Mai 1972, P. 773.
- 14 - CLARKSON T.W.
Biochemical aspects of Mercury poisoning.
Journal of occupational Medicine, July 1968, Vol. 10, N° 7, P. 351/
355.
- 15 - CLARKSON T.W.
Epidemiological and experimental aspects of lead and mercury
contamination of food.
Fd Cosm. Toxic., 1971, 9, 229/243.

- 16 - COLAS R.
La pollution des eaux; collection "Que sais-je ?"
Presses universitaires de France, 1973, N° 983.
- 17 - CUMONT G.
et al. Mercure et toxicologie alimentaire.
Bull. Acad. Vet. 1972, 45 (3), 117/126.
- 18 - CUMONT G.
Utilisation et consommation du mercure en France.
Rec. Med. Vet., 1972, 148 (4), 427/442.
- 19 - CUMONT G.
et al. Contamination des poissons de mer par le mercure.
Rev. Intern. Océanogr. Méd., 1972, 28, 95-128.
- 20 - DALES L., KAHN E., WEI E.
Methylmercury poisoning. An assessment of the sportfish hazard
in California.
California Med. 1972, 114, (3), 13/15.
- 21 - DUVAL C.
Le mercure; collection "Que sais-je ?"
Presses Universitaires de France, 1968, N° 1317.
- 22 - EYL T.B.
Mercury, fish and human health.
Mich. Med., 1970, 69, 873/880.
- 23 - EYL T.B.
Methyl mercury poisoning in fish and human beings.
Clin. Toxicol. 1971, 4, (2), 291/296.
- 24 - FABRE et TRUHAUT
Précis de toxicologie, 1961, tome 2, 597.
- 25 - F.A.O.
Rapport du séminaire sur les méthodes de détection de mesure et de
contrôle des agents de pollution du milieu marin.
Rome Juin 1972, N° 99 sspp1. I, P. 39/53, 105/113, 119/123.

- 26 - FOLZ J.M.
La pollution par le mercure et le cadmium constitue deux problèmes majeurs au Japon.
Annales des Mines, Mars 1972, P. 43.
- 27 - GATTI G.L.
Le problème de la présence de mercure dans l'environnement et les résidus à l'état de trace dans le poisson.
Sci. Dell Aliment. Ital. 1971, 17, N° 5, 105/12.
- 28 - GAVIS J., FERGUSON J.
Pollution par le mercure, son cycle naturel dans le milieu aquatique - formes minérales et organiques.
Water Research, vol. 6-1972, P. 989/1008.
- 29 - GILLULY H.
Mercury pollution, new studies a lot of work must still be done.
Sciences News, 4 Sept. 1971, P. 156.
- 30 - GOLDWATER L.G.
Mercury in the environment.
Scientif. American, May 1971, 224, P. 15/21.
- 31 - GREESON P.E.
Biological factors in the chemistry of mercury.
Geol. Surv. U.S.A., 1970, 713, 32/34.
- 32 - HAMMOND A.L.
Mercury in the environment : natural and human factors.
Science 1971, 171, (3973), 788/789.
- 33 - HARADA Y., MORIYAMA H. and NONAKA M. (1971)
Investigation on babies of Minamata Disease at a later period.
Jap. J. Clinic. Exper. Med. 48, 1431/1440.
- 34 - HOSOKAWA H.
Clinical observation of the encephalopathia from unknow cause in Minamata district of Kyushu Japan.
Journ. Kumamoto med Soc 1956, 30, 1252/1258.

- 35 - HANSEN J.C., BONDE G.J.
Microbiological determination of mercury in trace amounts.
Rev. Intern. Oceanographie. Med. 1969, tomes 15, 16, P. 5/27.
- 36 - IAEA (Intern. Atomic Energy Agency).
Mercury contamination in man and his environment.
Vienne, IAEA, 1972.
- 37 - INTYRE A.R.
The toxicities of mercury and its compounds.
J. Clin. Pharmacol. (1971), II, (6), 397/401.
- 38 - JENSEN S.
Biological methylation of mercury in aquatic organism.
Nature London, 1969, 223, 753/754.
- 39 - JONES H.R.
"Mercury Pollution Control".
Noyes Data Corp, New Jersey, U.S.A., 1971.
- 40 - KAMPS L.R.
et al. Total mercury-monoethylmercury content of several species of fish.
Bull. Env. Cont. Toxic. 1972, 8 (5), 273/9.
- 41 - KATSURO I., KONDO T., KAI F., FUJIKI M.
"Studies on the origin of the causative agent of Minamata disease".
Kumamoto medical journal, 1961, vol. 14, N° 4, 157/187.
- 42 - KURLAND L.T., SEIDLER H.
Minamata disease. The outbreak of a neurologic disorder and its relationship to the ingestion of seafood contaminated by mercuric compounds.
Wld Neurologic, 1960, 1, 370-395.
- 43 - LAMBOU V.
"Report on the problems of Mercury Emissions into the Environment of the United States".
Environment of the United States".
Environment Protection Agency, U.S.A. (1972).

- 44 - LARSSON J.E.
Environmental mercury research in sweden.
Stockholm, June 1970, P. 2-5, 8/15, 23/27.
- 45 - LE FAUCHEUX O.
Pollution et protection des mers et des plages.
Précis général des nuisances, Ed. LE PRAT, Paris 1971, Chap. 2,
P. 106, 110, 111.
- 46 - LEMAIRE R.
Les médecins et l'environnement.
Médecine et Hygiène, 1970, 28 (925), II/53.
- 47 - LEMAIRE R.
Les incidences médicales des problèmes d'environnement.
Médecine et Hygiène, 1971, 29 (4), I.
- 48 - LEMAIRE R.
L'approche technologique des problèmes des nuisances.
Médecine et HYgiène, 1971, 29 (4), II.
- 49 - LEPINE P.
Epidémiologie de quelques pollutions toxiques.
Le Moniteur de Pharmacie, 14 Octobre 1972, N° 1052, 3027/2031.
- 50 - NOBBS L.
"Utilisation du mercure et choix social".
Rapport de l'O.C.D.E., Mai 1972.
- 51 - NUZZI R.
Toxicity of mercury to phytoplankton.
Nature 5 Mai 1972, P. 38/40.
- 52 - OMS.
Risques pour la santé du fait de l'environnement.
Genève, OMS., 1972, P. 87/88, 195/200.
- 53 - OMS et FAO.
Etude des aspects scientifiques de la pollution des mers.
(GESAMP), Rome 22-27 Février 1971, P. 6/9/13.

- 54 - POTIER M. et RADET M.
La toxicologie du mercure et de ses dérivés.
Le Moniteur de Pharmacie, 24 Juin 1972, N° 1040, 2101/2106.
- 55 - RAMEL C.
Genetic effects of organic mercury compounds.
Hereditas 1967, 57, 445/451.
et Hereditas 1969, 61 P. 231.
- 56 - SKERFVING S.
Mercury in fish : some toxicological considerations.
Food Cosmet. Toxic, 1972, 10 (4), 545/56.
- 57 - SOUDAN F.
Incidences de la pollution sur la vie marine.
Science et Pêche, Bull. Inst. Pêches Marit. Avril 1968 N° 169.
- 58 - TAKEUCHI T., MATSUMOTO H., ETOH M., KOJIMA H. and MIYAYAMA H. (1970)
The Minamata disease and its degenerative change ten years after
the outbreak.
Jap. Med. J. 2402, 22/27.
- 59 - THIBAUD Y.
Teneur en mercure dans les moules du littoral français.
Science et Pêche, Bull. Inst. Pêches Marit., Janvier 1973, N° 221,
P. 1 à 6.
- 60 - THIBAUD Y.
Teneur en mercure dans quelques poissons de consommation courante.
Science et Pêche, Bull. Inst. Pêches Marit., Décembre 1971, N° 209,
P. 1 à 10.
- 61 - TOKUAMI H., OKAJIMA T., KANAI J.
"Minamata disease - an unusual neurological disorder occurring un
Minamata, Japan".
Kumamoto medical Journal, 1961, Vol. 14, N° 2, 47/63.
- 62 - TOKUOMI, HARUHIKO
Medical aspects of Minamata disease.
Rev. Intern. Oceanogr. Med. 1969, tomes 13 et 14, P. 5/35.

- 63 - TOLAN A., ELTON G.A.H.
Mercury in food.
Biochem. J. (1972), 130 (2), 69/70.
- 64 - TRUHAUT R. et BOUDENE C.
"Microdosage du mercure dans l'urine et les milieux biologiques complexes".
Les cahiers de notes documentaires, Avril 1964, N° 35.
- 65 - TSURU SH.
Pollution au Japon "KOGAI", le courrier de l'UNESCO,
Juillet 1971, P. 8, 10.
- 66 - UI J.
Minamata disease and water pollution by industrial waste.
Rev. Intern. Oceanogr. Med. 1969, Tomes 13 et 14, 37/44.
- 67 - UI J. and KITAMURA M.
Mercury pollution of sea and fresh water, its accumulation into water biomass.
Rev. Intern. Océanogr. Med. 1971, tomes 22/23, 79/128.
- 68 - WALLACE R.A. et al.
"Mercury in the Environment : the Human Element".
Oak Ridge National Laboratory, USA.
(ORNL-NSF-EP-1) (1971).
- 69 - WILLISTON S.H. (1968)
Mercury in the Atmosphere.
J. Geophys. Res., 73, 7051.
- 70 - WOBESER G.
Mercury poisoning from fish.
Canada Med. Ass. J., 30 Mai 1970, 102, 1209.

- : - : - : - : -

TABLE DES MATIERES

~ ~ ~ ~ ~

- PREAMBULE	P. 1
- PLAN	P. 3
- INTRODUCTION	P. 7
- EPIDEMIOLOGIE	P. 9
- SOURCES DE POLLUTION	P. 14
- ASPECTS BIOCHIMIQUES ET TOXICOLOGIQUES	P. 19
- NOSOLOGIE DE L'INTOXICATION MERCURIELLE	P. 28
- LES RISQUES D'INTOXICATION EN FRANCE	P. 38
- PROPHYLAXIE	P. 50
- CONCLUSION	P. 58
- BIBLIOGRAPHIE	P. 60

~ ~ ~ ~ ~

"Par délibération de son Conseil, en date du 10 Novembre 1972, l'Université n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ou mémoires. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs".

VU, le Président de Thèse :

VU, le Doyen de la Faculté :

VU et permis d'imprimer :
Le Président de l'Université de CAEN

